

CARCINOMA COLORECTAL
PROTOCOLO CONSENSUADO DE SEGUIMIENTO

Comité de Coloproctología HUVR

Enero 2011

CALENDARIO DE PROCEDIMIENTOS

	1º y 2º año	3er año	4º y 5º año
Anamnesis y EF	Cada 3-6 m	Cada 6 m	Anual
CEA	Cada 3-6 m	Cada 6 m	Anual
Colonoscopia	1ª Colonoscopia: 1 año después de la cirugía (3-6 m si colonoscopia preQca incompleta): - Si pólipo > 1 cm o pólipo vellosos o con displasia de alto grado: repetir al año - Si nada de lo anterior: repetir a los 3 años y posteriormente cada 5 años		
TAC torax, abdomen y pelvis	Anual*	Anual*	No de rutina

* Se podrá considerar su realización cada 6 meses en pacientes tributarios de rescate quirúrgico de metástasis metacrónicas

SERVICIOS RESPONSABLES DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO

1. **Sº DIGESTIVO:** Pólipos displásicos o Adenocarcinoma estadíos 0-I (Tis/T1/T2 N0M0)
2. **Sº CIRUGIA COLOPROCTOLOGICA:** Adenocarcinoma estadio IIA (T3N0M0)
3. **Sº ONCOLOGIA MEDICA:** Adenocarcinoma estadio IIB (T4N0M0), III y IV

Una vez completados 5 años de seguimiento desde la intervención quirúrgica sin evidencia de recidiva tumoral el paciente será dado de alta y derivado a **ATENCIÓN PRIMARIA** con un informe en el que se haga constar que el paciente debe continuar realizándose una **colonoscopia cada 5 años** de por vida para descartar lesiones metacrónicas.