


✓ El DIAGNÓSTICO debe ser clínico: CRITERIOS DE ROMA III

Paciente >50 años



Paciente <50 años: NO COLONO, EMPEZAR CON ANALÍTICA Y TT.

INERCIA COLÓNICA

El tratamiento es escalonado:

1. LACTULOSA: los primeros tres días 15ml/12h, después cada 24h.
2. BISACOLIDO, (DULCOLAXO): 5-10mg/24h (noche) ó PICOSULFATO DE SODIO, (EMULIQUEN): 5-15 mg/24h (noche).
3. Continuar con 2º escalón
+ DOMPERIDONA 10-20 mg/8h, 15-30min antes de la comida.
Ó CLEBOPRIDA 0,5 mg/8h
Ó CINITRAPIDA 1mg/8h, 15 min antes de la comida.
4. PRUCALOPRIDA (RESOLOR) 1-2mg/24h, a cualquier hora.

ANCIANO

El tratamiento es escalonado:

1. DIETA CON AUMENTO DE FIBRA
2. Continuar con 1º escalón
+ PLANTABEN (PLANTAGO OVATA) 1 sobre/ 12-24h + AGUA
3. FIBRA DIETA + LACTULOSA (Cuidado en diabéticas!!!) 15ml/24h.
4. BISACOLIDO, (DULCOLAXO): 5-10mg/24h (noche).
5. 1º + 2º + 3º + 4º + DOMPERIDONA 10-20mg/8h ó CLEBOPRIDA 0,5 mg/8h ó CINITRAPIDA 1mg/8h.

MEGACOLON – MEGARECTO

El tratamiento es escalonado:

1. EUPEPTINA 100g/24h (1 cucharada/24).
2. 1^{er} escalón + ENEMA CASSEN 250ml/noche.
3. 1^{er} + 2^o + BISACOLIDO, DULCOLAXO 5-10mg/24h (noche).

EMBARAZO

1. PLANTAGO OVATA 3,5g /24h

LESIÓN MEDULAR

El tratamiento es escalonado:

1. Primeras 2 semanas: DIGITACIÓN + SUPOSITORIOS DE GLICERINA diario
2. > 2 semanas: DIGITACIÓN + SUPOSITORIOS DE GLICERINA cada 3 días
+ PICOSULFATO DE SODIO, (EMULIQUEN): 5-15 mg/24h (noche).
3. Mantenimiento: ESTIMULACIÓN CON ENEMAS +/- DIGITACIÓN + PICOSULFATO DE SODIO (EMULIQUEN), cada 3 DÍAS.

TOMA DE OPIÁCEO

- BISACOLIDO, DULCOLAXO 5-10mg/24h (noche).
Ó
- PICOSULFATO DE SODIO, (EMULIQUEN): 5-15 mg/24h (noche).

EN PACIENTE ONCOLÓGICO

El tratamiento es escalonado:

1. Comprimido de FISOLAX o 1 gragea de PURSENID al acostarse.
2. FISOLAX 1 comprimido mañana y otro por la noche.
3. 1 comprimido de FISOLAX Ó PURSENID por la mañana y un supositorio de DULCOLAXO por la noche.
4. 1 comprimido de FISIOLAX Ó PURSENID por la noche y 1 microenema de MICRALAX por la mañana días alternos.