

PROFILAXIS ENDOCARDITIS CIRUGIA COLORRECTAL

Droga	Regimen en adultos
Ampicillina, gentamicina, and amoxicillina	Ampicillina IM ó IV (2.0 g) + Gentamicina (1.5 mg/kg; no exceder 120 mg) 30 minutos antes del procedimiento, seguido de Amoxicillina (1 g) oral, 6 horas después de la dosis inicial o Ampicillina 1 g IM o IV.
Vancomicina y Gentamicina (1)	Vancomicina 1 g a pasar en 1 ó 2 horas + Gentamicina 1(1.5 mg/kg; no exceder 120 mg), ambas dosis deben terminar 30 minutos antes inicio del procedimiento
Amoxicillina o ampicillina (2)	Amoxicillina 2 g oral o Ampicilina 2 g IM o IV dentro de los 30 minutos de comenzar el procedimiento.

IM = intramuscular; IV = intravenoso

(1) Alérgicos Penicilinas (2) Riesgo moderado

Alto Riesgo
Válvulas protésicas cardiacas
Historia previa endocarditis
Shunt Pulmonar construido quirúrgicamente
Enfermedad cardiaca cianotizante congenita
Prótesis vascular (dentro de los 6 meses implantación)
Moderado Riesgo
Resto de malformaccardiacas
Enfermedad valvular caca (pe. Rea)
Miocardopatía hipeProlapso mitral con ingurgitación y/o engrosamiento valvas